

Avertissements agricoles



Bulletin Technique n° 12 du 10 mai 1990

Abonnement annuel : 190 F

- * **CEREALES :**
Intervenez si la septoriose est présente sur la F3
- * **BETTERAVES :**
Renouvelez la protection
- * **COLZA :**
Des infestations de Charançons des Siliques sont signalées
- * **MAIS :**
Traitement anti-liseron

** CEREALES **

-----SEPTORIOSE

- * **SITUATION :** stade gonflement atteint dans de nombreuses parcelles.
- * **PRECONISATION :** si aucun traitement n'a été réalisé, intervenez si la septoriose est présente sur la F3, avec une bouillie fongicide efficace également sur Rouille.

** BETTERAVES **

-----PUCERONS

- * **SITUATION :** les vols de pucerons restent faibles, la plupart des parcelles ne sont que peu contaminées. Dans certaines situations non protégées, des colonies importantes ont été observées.
- * **PRECONISATION :** assurez ou renouvelez la protection en utilisant une association à base de pyrèthrine. Traiter également les parcelles qui ont été protégées avec les microgranulés Témik G ou Dacamox.

** COLZA **

-----CHARANCON DES SILIQUES

Des infestations sont signalées (seuil de traitement : 1 charançon/2 plantes).
Utilisez les produits cités dans la fiche de bulletin n° 4 du 15 mars 1990.

** MAIS **

-----LISERON

Ce traitement est à effectuer obligatoirement entre le stade levée et 6 feuilles, il est d'autant plus efficace que le liseron est développé.

Les produits commerciaux suivants peuvent être utilisés : Banvel 4 S (0,6 l/ha) ou Starane 200 (1 l/ha).

Les traitements doivent être effectués à des températures comprises entre 10°C et 25°C.

P402

